

1 Signos y Síntomas

Fiebre en la semana después de la visita a la Sala de Emergencia (ER, por sus siglas en inglés) o de la visita a la clínica

Y

Uno o más de los problemas siguientes:

SIGNOS

- erupción
- linfadenopatía
- ulceraciones orales/genitales/rectales
- faringitis exudativa
- meningitis aséptica (dolor de cabeza, fotofobia, rigidez de nuca)

SÍNTOMAS

- mialgia/artralgia
- fatiga (cansancio)
- pérdida de peso
- sudoración nocturna
- anorexia



Aprenda a reconocer el

Síndrome Por VIH Agudo



2 Para hacer el diagnóstico...

- Identifique a los individuos en riesgo
 - Realice la prueba de "ELISA" para VIH y la prueba de "PCR" para VIH*
 - Si la prueba de "Elisa" es negativa y la prueba de "PCR" es positiva, los criterios diagnósticos se han establecido
- * se prefiere hacer el diagnóstico con el "PCR" para VIH, pero si éste no está disponible, se puede medir la "carga viral" mediante el "PCR" (bADN o ARN) para VIH.

3 ¿Es positivo el diagnóstico?

- **ACONSEJE AL PACIENTE**
 - 1) Ésta es una infección muy temprana por VIH
 - 2) Él/ella puede contagiar muy fácilmente a otras personas
 - 3) La transmisión del VIH es muy posible
 - 4) Se le debe comunicar a las parejas sexuales o a las personas con las que se consume droga
- **RECOMIENDE AL PACIENTE**
 - 1) Le puede ser de gran beneficio la *Evaluación Temprana por Expertos*
 - 2) Vaya **inmediatamente al Centro de Estudio para VIH Agudo de su zona**
 - 3) Si no hay un Centro de Estudio para VIH Agudo en su zona, comuníquese con el Centro de Educación y Entrenamiento para el SIDA (AETC, por sus siglas en inglés) local que se anota abajo, para una remisión rápida.



Centro Nacional de Consultas a Profesionales de la Salud sobre el VIH/SIDA, que incluye las líneas de Teléfono Warmline (800-933-3413) y PEpline (888-HIV-4911) con personal que brinda servicios de orientación clínica las 24 horas del día
www.nynjaetc.org
212-305-8291



¡EL TIEMPO APREMIA!

Comuníquese con el
Centro de VIH Agudo
de su zona

